Выявление мод изменчивости температуры поверхности Японского моря по ежедневным спутниковым данным

О.О. Трусенкова, В.Б. Лобанов, Д.Д. Каплуненко
ТОИ ДВО РАН
Владивосток

Введение

Межгодовая и междесятилетняя изменчивость ТПО за счет вариаций локального теплообмена с атмосферой; связи с атмосферными системами:

- Сибирский максимум ~ Арктическое и Северо-атлантическое колебания
 - Северо-тихоокеанский максимум
 - Алеутская депрессия
 - струйное течение в верхней тропосфере.
- (Minobe et al., 2004; Park and Chu, 2006)
-

Физический механизм формирования АТПО за счет динамических процессов: турбулентное вовлечение на нижней границе ВКС

(Федоров и Гинзбург, 1988):

- локальная завихренность ветра (дивергенция поверхностных течений)
- адвекция тепла течениями и структурами синоптического масштаба.

Интенсивная синоптическая динамика в Японском море.

Доступность данных о ТПО высокого разрешения.

Цель работы

Выявление динамически обусловленных аномалий температуры поверхности Японского моря на основе статистического анализа ежедневных полей высокого разрешения

Данные ТПМ

Daily New Generation (NG) SST, Tohoku University, Sendai, Japan,
1 июля 2002 г. – 9 июля 2006 г., 34.5°- 48°с.ш., 127.5°- 142°в.д.,
исходная сетка: 0.05°, усреднены до 0.25° для расчетов,
спутниковые данные, ИК и МК диапазоны

Daily Japan Meteorological Agency (JMA) SST,
12 октября 1993 г. – 8 ноября 2006 г., 35°- 48°с.ш., 127.5°- 142°в.д.,
сетка: 0.25°, спутниковые ИК и МК + *in situ*

Поля ветра у поверхности Земли

NCER/NCAR Reanalysis, 4 срока в сутки, сетка: 1°x1°,
1998-2005 гг., 34°-53°с.ш., 127°-143°в.д.
(SeaWiFS Project Ancillary Data)

Комплексный ЭОФ анализ

$$X(\mathbf{r}, t) = \sum A_k(\mathbf{r})B_k(t),$$

где $\mathbf{r}$ – пространственные координаты и t - время,

$$X(\mathbf{r}, t) = X_r(\mathbf{r}, t) + iX_i(\mathbf{r}, t),$$

$X_r(\mathbf{r}, t)$ – вещественная часть (исходные поля),

X_i – мнимая часть, рассчитанная с помощью преобразования Гильберта,

$A_k(\mathbf{r}) = A_k(\mathbf{r})e^{-i\varphi}$ - пространственная функция (КЭОФ),

$B_k(t) = B_k(t)e^{-i\phi}$ - временная функция (ГК),

A_k / B_k – временная и пространственная амплитуда,

φ_k / ϕ_k – временная и пространственная фаза ($-180^\circ, 180^\circ$).

$X_a(\mathbf{r}, t) = X(\mathbf{r}, t) - A_1(\mathbf{r})B_1(t)$ – остаточные аномалии,

$X_{a'}(\mathbf{r}_0, t) = A_k(\mathbf{r}_0)B_k(t)$ – временной ряд аномалий, связанных с k -той модой в точке $\mathbf{r}_0$,

$X_{a'}(\mathbf{r}, t_0) = A_k(\mathbf{r})B_k(t_0)$ – поле аномалий, связанных с k -той модой, в момент времени t_0 .

Гидротермодинамическая многослойная модель циркуляции Японского моря (Шапиро и Михайлова, 1992-1998)

- Прimitивные (полные) уравнения гидродинамики в приближениях гидростатики и Буссинеска;
- свободное перемещение поверхностей раздела по вертикали;
- термодинамический блок: баланс тепла и влаги на поверхности моря, интегральная модель ВКС, прогностические уравнения для T и S ;
- переменная плотность во всех слоях в пределах, определяемых «базовой» плотностью;
- бигармоническая вязкость;
- приближение свободной поверхности моря;
- конвективное приспособление.

Зимний муссон

Летний муссон, ветра с западной составляющей

Вектора:
дин./см²
ИЗОЛИНИИ:
2x10⁻⁸
дин./см³

Типовые поля напряжения и завихренности ветра

(Трусенкова и др., 2007, Изв. АН, ФАО, №5)

Летний муссон, ветра с восточной составляющей

Разложение полей JMA, мода 1: средний годовой ход

Средний годовой ход:

- однородность по морю,
- минимум ТПМ в феврале-марте, максимум в августе,
- асимметрия: быстрый весенний прогрев, медленное осеннее охлаждение;
- межгодовая изменчивость за счет вариаций теплообмена с атмосферой.

АТПМ, связанная с 1й модой:

$$\mathbf{X}_a'(\mathbf{r}_0, t) = A_1(\mathbf{r}_0)B_1(t)$$

Межгодовая изменчивость годового хода за счет вариаций теплообмена с атмосферой

Связь АТПМ с температурой воздуха зимой и летом

Связь АТПМ со скоростью ветра летом, менее очевидна зимой

Остаточные аномалии ТПМ: сравнение полей JMA и NG

АТПМ 1го порядка получены вычитанием среднего годового хода (вклада моды 1):

$$\mathbf{X}_a^{(1)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{X}(\mathbf{r}, t) - A_1^{(0)}(\mathbf{r})B_1^{(0)}(t)$$

Амплитуда:
JMA цветом, NG линиями
Фаза показана для JMA, для NG - аналогично

Сходные распределения
для мод 1 и 2

Различия для моды 3

Поля JMA: доминирующие периодичности мод 1-3

Мода 1: 12 месяцев,
макс. АТПМ в декабре.

Мода 2: 6 месяцев,
макс. АТПМ в мае-июне
и ноябре-декабре.

Мода 3: 12 месяцев,
макс. АТПМ в июле-
октябре.

СЗ ядро

Мода 1: поправка к среднему годовому ходу

АТПМ связана с вихрем, а не со скоростью ветра

Напряжение и вихрь ветра в декабре

Скорость ветра в декабре

Температура

Макс. АТПМ в декабре

Южное ядро

АТПМ связана с поступлением субтропических вод в Корейский пролив

Макс. расход: октябрь-ноябрь (Takikawa, Yoon, 2005)

Южное и СЗ ядра связаны с различными процессами, но имеют сходную временную изменчивость → одна мода

Модельная циркуляция Японского моря (осень – зима)

Напряжение и вихрь ветра в декабре

Диполь вихря

Ц вихря

СЗ фронт
(Danchenkov et al., 1997;
Lobanov et al.,
2001; Никитин,
2002, 2006)

Уровень моря

Ц
круговорот

Ц
круговорот
АЦ вихря

- Диполь вихря - особенность ветрового режима в период зимнего муссона;
- понижение ТПМ за счет дивергенции поверхностных вод под воздействием Ц вихря ветра;
- воспроизведено также двухслойной моделью (Yoon et al., 2005).

Мода 2: полугодовая периодичность

АТПМ максимальна в мае-июне и ноябре-декабре,
минимальна в феврале-марте и августе-сентябре

Полугодовой масштаб выявлен в:

- исходных полях спутниковой ТПМ, особенно в северной части Японского моря (Park and Chung, 1999);
- уровне, особенно в западной части Японского моря (Колдунов и др., 2007);
- расходе в Корейском проливе (Takikawa and Yoon, 2005);
- интегральном расходе между г. Находка и Наоетсу (Пальшин и др., 2001);
- давлении у поверхности Земли, особенно в средних широтах над СЗТО (Седов, 1990).

Полугодовая периодичность в повторяемости вихря ветра над Японским морем

Повторяемость: (доля боксов над морем):

Ц вихрь,
если $\text{rot}\tau > C_1$;

АЦ вихрь,
если $\text{rot}\tau < -C_1$;

Слабый ветер,
если $-C_1 < \text{rot}\tau < C_1$

$$C_1 = 0.5 \times 10^{-8} \text{ дин./см}^3$$

АЦ вихрь (синим), макс.: апрель-июнь, сентябрь-октябрь

Ц вихрь (красным), макс.: зима, июль-август

Слабый ветер (зеленым): макс. – лето, мин. - зима

- Противофаза повторяемости Ц и АЦ вихря ($R = -0.67$).
- Полугодовая периодичность Ц/АЦ вихря.
- Годовая периодичность слабого ветра.

Связь АТПМ в западном ядре полугодовой моды с повторяемостью АЦ вихря ветра

Лаговые корреляции:
повторяемость АЦ вихря ветра - АТПМ

Полугодовой
масштаб
совместной
изменчивости

Предшествование
ветра АТПМ

АТПМ, связанные со 2й модой, запаздывают по отношению к повторяемости вихря ветра на 2 месяца

Сезонная изменчивость субарктического фронта и АЦ вихреобразование

Модельная циркуляция

Сдвиг САФ на север в апреле-июне (Никитин, 2006)

Положительные АТПМ в западном ядре полугодовой моды можно объяснить северным сдвигом САФ и интенсификацией АЦ вихреобразование, вызванными АЦ вихрем ветра.

Интенсификация вихреобразования в апреле и октябре (Никитин, 2006)

Полугодовая мода:
северное ядро

*Почему
противофаза?*

Летний муссон, ветра с
западной составляющей

Летний муссон, ветра с
восточной составляющей

В теплые месяцы имеется тенденция к противоположному знаку вихря ветра над центральной и северной (Татарским проливом) частями моря

Изменения вихря ветра могут привести к различиям в циркуляции вод северной части моря и Татарского пролива

Модельная циркуляция вод северной части Японского моря и Татарского пролива

Уровень моря

Ц циркуляция северной части моря усиливается (ослабеваает) под воздействием ветров с западной (восточной) составляющей, в противоположность центральной части.

Межгодовая изменчивость циркуляции весной и летом (Дьяков, 2006);
АЦ вихреобразование в северной части Японского моря (Никитин, 2005)

АТПМ2 полей ЖМА: полугодовая и 3х-ядерная моды

АТПМ 2го порядка :

$$\mathbf{X}_a^{(2)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{X}_a^{(1)}(\mathbf{r}, t) - A_1(\mathbf{r})B_1(t)$$

АТПМ2 и АТПМ1 полей ЖМА и NG:

Полугодовые моды подобны.

3х-ядерная мода:

- ЮЗ ядро в районе Восточно-корейского течения;
- восточное ядро над склоном у о. Хонсю – район Цусимского течения;
- северное ядро над континентальным склоном в зоне Приморского течения.

Временная изменчивость 3х-ядерной моды АТПМ2 полей JMA

- АТПМ слабее, чем у старших мод.
- Наибольшее развитие АТПМ в августе-сентябре, иногда с июля по ноябрь.
- Слабые АТПМ противоположного знака весной.
- **Межгодовая изменчивость.** *Сильные АТПМ летом 1994, 1999, 2000, 2002 гг.*

В 2003 г. нет летних аномалий, что является причиной различия полей NG и JMA.

Схема течений Японского моря и 3х-ядерная мода JMA

Схема переноса
субтропических
вод к берегам
Приморья
(Лобанов и др.,
2001)

- Положительные (отрицательные) АТПМ в ядре Хонсю (Приморском) → усиление Цусимского течения в восточной части моря и Приморского течения.
- Отрицательные АТПМ в южно-корейском ядре → ослабление АЦ циркуляции вод.
- АТПМ противоположного знака весной → противоположный характер динамических процессов.

• **Межгодовая изменчивость.** *Сильные АТПМ: 1994, 1999, 2000, 2002 гг.*

PIES Program: 1999-2001 гг.: слабое ВКТ; ВКТ отсутствовало с июня по ноябрь 2000 г.

(Chang et al., 2004; Mitchell et al., 2005).

Модельная циркуляция в августе под воздействием Ц вихря ветра

- АЦ циркуляция ослаблена в ЮЗ части моря.
- Интенсификация Цусимского течения у берегов о. Хонсю
- и Приморского течения.

Повторяемость ветров с восточной составляющей повышена в июле - сентябре

Межгодовая изменчивость не объяснена

Стоячие и перемещающиеся АТПМ (3х-ядерная мода полей NG)

Мгновенные поля АТПМ

Эпизод с 17 июля
по 9 сентября 2005 г.

изобаты
800, 1500 м

Западная ветвь Цусимского течения

*Плавное увеличение пространственной и
временной фазы: перемещение АТПМ.
Оценка скорости ~ 10 см/с – соответствует
адвективному масштабу.*

Выводы

- Выявлены аномалии температуры поверхности Японского моря, обусловленные динамическими процессами, что стало возможным после удаления среднего годового хода, изменчивость которого связана с вариациями теплообмена с атмосферой.
- Выявленные АТПМ обусловлены адвекцией субтропических вод через Корейский пролив, дивергенцией поверхностных вод под воздействием Ц вихря ветра, меридиональными сдвигами САФ в западной части моря, АЦ вихреобразованием, усилением или ослаблением ветровой циркуляции в отдельных районах.
- Выявлены 12-месячные периодичности, отличные от годового хода.
- Выявлена полугодовая мода изменчивости ТПМ, запаздывающая на 2 месяца по отношению к изменениям вихря ветра над морем.
- Выявлено эпизодическое перемещение АТПМ в конце лета – начале осени от района Сангарского пролива с востока на запад, что можно связать с западной ветвью Цусимского течения.

Благодарности

- Н.Б. Шапиро и Э.Н. Михайлову, МГИ, г. Севастополь, за предоставленную нам программу модели и многочисленные консультации.
- С.С. Станичного и Ю.Б. Ратнера, МГИ, г. Севастополь, за подготовку данных NCEP о ветре.

Благодарим за внимание