



Т.В. Белоненко




Методы исследования «КОТЛОВИННЫХ ВОЛН» Лофонтенской котловины Норвежского моря

Четвертая Международная школа-семинар «Спутниковые методы и системы исследования Земли»

Таруса, ИКИ РАН, 19-25 февраля 2013 г.

Sub-Arctic “hot spot” of variability



- A sub-Arctic “hot spot” of SSH variability (largely due to mesoscale signals) is observed in the Lofoten Basin of the Norwegian Sea
- LB is the major heat reservoir for the Nordic Seas [Björk et al., 2001], where large ocean-atmosphere interactions occur [Nilsen and Falck, 2006; Rossby et al., 2009]

Цель исследования

В низкочастотную изменчивость уровня Норвежского моря существенный вклад вносят градиентно-вихревые волны типа топографических волн Россби. Эти волны определяют циклоническое вращение неоднородностей уровня моря относительно центра ЛК и получили название «котловинные волны».


Используемые данные:

- Спутниковые альтиметрические измерения: архив AVISO, данные *SSH* и *SLA* спутников ERS-1/2 и Envisat (1/3° Mercator grid).

Circulation in the Lofoten Basin

- The surface cyclonic circulation is not obvious in more recent studies based on longer drifter records [Björk et al., 2001; Jacobsen et al., 2003; Koszalka et al., 2011];
- It is neither present in the most recent mean dynamic topography products, which show the dominance of an anticyclonic flow.

**Trajectories of 100 surface drifters (Sep. 1996 – Aug. 2010)
and geostrophic velocity vectors**



Space-Time Lagged Correlation of SSH Fields


- At each (x,y) we compute the cross-correlations of SSH (h) in square boxes (180×180 km) for time lags $\Delta t \leq 12$ weeks [see Fu 2006 and 2009 for details]:

$$C_{x,y}(\Delta x, \Delta y, \Delta t) = \overline{h(x, y, t)h(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t)}$$

- An average velocity vector weighted by the correlation coefficients (C_i):



$$(u, v) = \left(\sum_i (\Delta x_i / \Delta T_i, \Delta y_i / \Delta T_i) \cdot C_i \right) / \sum_i C_i$$

Velocity vectors of SSH anomaly propagation and MDT_CNES-CLS09 (cm)





Modal Structure: Complex SVD


**CSVD-1
13.5 %**



**CSVD-2
8.2 %**



**Temporal
phase of
CSVD-1 (blue)
& CSVD-2 (red)**



- Two statistical modes propagating cyclonically: di-pole and quadri-pole;
- The wavelength of the rotating CSVD-1 and CSVD-2 patterns is approximately 500 km;
- The frequency of waves is not constant.

Преобразование Гильберта

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В **математике** и **обработке сигналов** **преобразование Гильберта** — **линейный оператор**, сопоставляющий каждой функции *u*(*t*) функцию *H*(*u*(*t*)) в той же области.

Преобразование Гильберта может быть определено в смысле главного значения интеграла по Коши:

$$H(u)(t) = \frac{1}{\pi} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

Или, более явно:

$$H(u)(t) = -\frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{u(t + \tau) - u(t - \tau)}{\tau} d\tau.$$

При двукратном применении преобразования Гильберта функция меняет знак:

$$H(H(u))(t) = -u(t),$$

при условии, что оба преобразования существуют.

Связь с преобразованием Фурье

Преобразование Гильберта является множителем в спектральной области.


$$\mathcal{F}(H(u))(\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega) \cdot \mathcal{F}(u)(\omega),$$

где $\mathcal{F}(f)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ — вариант прямого преобразования Фурье без нормировочного множителя.


Обратное преобразование

$$H^{-1} = -H$$

1 мода разложения по СЕОФ



2 мода разложения по СЕОФ



Вывод дисперсионных соотношений


$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \eta - \frac{f^2 \eta}{gH} \right) + \beta \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{f}{H} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial x} \right) = 0 \quad \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial p}{\partial z} + \left(\frac{s\beta_e}{\omega} - \frac{4s^2}{z^2} \right) p = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \eta}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial \theta^2} \right) - \frac{H}{r} \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{f}{H} \right) = 0$$

$$\eta = p(r) \cdot \exp[i(s\theta - \omega t)]$$


$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} - \frac{s^2}{r^2} p + \frac{s\beta_e}{r\omega} p = 0$$

$$\eta = \sum_{s=0}^{\infty} A_s \exp[i(s\theta - \omega t)] J_{2s}(2k\sqrt{r})$$




$$s = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \begin{Bmatrix} \frac{\beta_e}{(3.1\pi)^2 l} \\ \frac{4\beta_e}{(5.3\pi)^2 l} \end{Bmatrix}$$

«Эквивалентный» бета-эффект





В пределах котловины, исключая материковый склон с сильным фоновым течением, бета-эффект меняется в пределах от ~ 0 до $\sim 1.5 \times 10^{-10} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

Дисперсионные соотношения



Дисперсионные соотношения для двух-полюсной волны, а пунктиры - для четырёх-полюсной волны при заданных β_e .



Спасибо за внимание!